

Infectieziekten juni 2019

26 juli 2019

In juni ontving de GGD de volgende meldingen:

2 meldingen van hepatitis C
4 meldingen van kinkhoest
1 melding van salmonellose
1 melding van shigellose

Hepatitis C : beide meldingen waren chronische hepatitis C infecties. De gemelde personen bleken in de voorgeschiedenis risicofactoren voor het oplopen van hepatitis C te hebben. Risicofactoren voor het oplopen van hepatitis C zijn bijvoorbeeld het gebruik van onveilige naalden (druggebruik, tattoos, piercen) en onveilige seks. Mensen met hepatitis C worden, ongeacht of het een acute of een chronische infectie betreft doorverwezen naar een MDL (maag, darm, lever)arts voor behandeling.

Kinkhoest: er waren vier meldingen in juni, bij geen van de gemelde patiënten was sprake van risicocontacten in de directe leefomgeving.

Salmonellose: bij de gemelde salmonellapatiënt is de besmettingsbron onduidelijk gebleven, het was een op zichzelf staand geval.

Shigellose: deze patiënt deed de besmetting op tijdens een verblijf in het buitenland.

Overige meldingen en signalen

Artikel 26: vier kindercentra maakten melding van kinderen met huiduitslag (waterpokken, hand-voet-mondziekte).

Besmettingsaccidenten: er werden vier risicovolle contacten met zoogdieren gemeld, drie daarvan speelden zich af tijdens een verblijf in het buitenland. Een basisschool maakte melding van een dode vleermuis waar kinderen mogelijk mee hadden rondgelopen. Na het maken van een risico-inschatting werden waar dat nodig was vervolgacties in gang gezet.

Eikenprocessierups: vergeleken met 2018 er waren in juni opvallend veel mensen die de GGD belden om melding te doen van de eikenprocessierups. Het ging bij deze meldingen zowel om besmette bomen als om mensen die in aanraking waren geweest met de brandharen van de rupsen.

Medewerkers van basisscholen en kindercentra vroegen zich af of het nog wel verantwoord was om de kinderen buiten te laten spelen. De toename van de rupsen was landelijk zo opvallend dat er in de media veel aandacht voor was en een landelijke aanpak van het probleem werd voorgesteld.

Zodra de rupsen zich verpoppen tot vlinder (dit begint meestal in juli) neemt de overlast af, maar contact met achtergebleven brandharen kan dan nog steeds voor klachten zorgen.

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma: in juni verscheen bij het RIVM het jaarlijkse rapport over de vaccinatiegraad van het RVP. Landelijk is in 2018 een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het RVP krijgt. De landelijke vaccinatiegraad is hiermee nog niet terug op het oude niveau, maar is voor de meeste vaccinaties ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien. De landelijke vaccinatiegraad van HPV (baarmoederhalskanker) is met 45,5 procent gelijk gebleven aan het jaar ervoor, en lijkt voor jongere meisjes ook toe te nemen. De voorlopige landelijke vaccinatiegraad van de nieuwe meningokokken ACWY-vaccinatie is hoog (87 procent)(bron: RIVM).

In Gooi en Vechtstreek is de vaccinatiegraad 2018 voor alle RVP vaccinaties ruim boven de 90%, met uitzondering van de HPV (53.9%).

SOA-jaarrapport RIVM: landelijk is het aantal mensen dat een soa-test doet bij een Centrum voor Seksuele Gezondheid in 2018 gelijk gebleven, ruim 18 procent daarvan bleek een soa te hebben. Chlamydia is de soa die het meest frequent voorkomt onder hetero's. Bij MSM (mensen die seks hebben met mannen) is dat gonorrroe. In huisartsenpraktijken nam het aantal soa-consulten en -diagnoses toe, vooral onder mensen ouder dan 25 jaar (bron: RIVM). In Gooi en Vechtstreek is er vanaf

februari van dit jaar een soapoli, in nauwe samenwerking met GGD Flevoland. De eerste ervaringen geven een vergelijkbaar beeld als hierboven beschreven.

HPV vaccinatie voor jongens: vanaf 2009 krijgen meisjes op de leeftijd van 12 en 13 jaar vanuit het Rijksvaccinatieprogramma een vaccinatie aangeboden tegen het humaan papillomavirus (HPV). De Gezondheidsraad heeft op 19 juni 2019 geadviseerd om ook jongens te vaccineren tegen HPV en om de vaccinatie te vervroegen van 13 naar 9 jaar. Daarnaast adviseert de raad om een aanvullend vaccinatieprogramma op te zetten voor mensen tot en met 26 jaar. Naast baarmoederhalskanker, vaginakanker en schaamlipkanker kan een HPV infectie ook anuskanker, peniskanker en kanker in de mond- en keelholte veroorzaken. Door HPV vaccinatie kunnen deze kankers voor een groot gedeelte worden voorkomen. De staatssecretaris zal later besluiten of hij dit advies overneemt. (Bron: RIVCM, Gezondheidsraad).